

Política de Salud del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Mobile

Cuando su hijo **NO DEBERÍA** estar en la escuela (Revisado el 9-2-2021)

Muchos padres están preocupados por cuándo mantener a los niños que han estado enfermos en casa de la escuela. Las siguientes son algunas de las razones más comunes por las que los niños deben quedarse en casa o pueden ser enviados a casa desde la escuela.

1. Enfermedad similar a COVID: si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa y consulte con su médico para descartar COVID-19:

- Fiebre (100 grados o más) o escalofríos
- Tos
- Dificultad para respirar o dificultad respirando (no relacionada con otras afecciones)
- Fatiga
- Dolores musculares o corporales
- Jaqueca
- Nueva pérdida del gusto o del olfato
- Dolor de garganta
- Congestión o secreción nasal
- Náuseas o vómitos
- Diarrea

Si su médico diagnostica a su hijo o a cualquier persona en el hogar con COVID-19, comuníquese con la enfermera de su escuela de inmediato para que se pueda iniciar el rastreo de contactos adecuado. Por favor, cumpla con las órdenes de aislamiento / cuarentena emitidas por el ADPH, MCHD o su médico.

2. FIEBRE: Su hijo debe quedarse en casa si tiene fiebre de 100 grados (por vía oral) o más y debe permanecer en casa durante **24 horas** después de que la fiebre haya desaparecido sin medicamentos.

3. VÓMITOS Y/O DIARREA: Su hijo debe quedarse en casa si ha vomitado o tenido diarrea (más de dos o tres heces sueltas) la noche anterior o justo antes del inicio del día escolar y permanecer en casa durante 48 horas después de que los vómitos/diarrea hayan disminuido. Si hay una o dos heces sueltas junto con vómitos o fiebre, su hijo debe permanecer en casa. Si la diarrea continúa por más de 24 horas, su hijo necesitará una declaración escrita del médico para regresar a la escuela.

4. CONJUNTIVITIS: La conjuntivitis puede ser muy contagiosa. Si el blanco del ojo de su hijo es rojo y tiene un drenaje espeso de color amarillo o verdoso, debe mantener a su hijo en casa y comunicarse con el médico de su hijo.

- **El drenaje debido a alergias suele ser claro e involucra ambos ojos simultáneamente.**
- **La conjuntivitis puede involucrar solo un ojo a la vez.**
- **Los niños con conjuntivitis suelen ser sensibles a la luz y se quejan de picazón, ardor en los ojos, párpados hinchados y secreción seca en los párpados al despertar.**

5. PIOJOS DE LA CABEZA: Los niños **NO DEBEN** ser excluidos de la escuela por infestación activa o cuando las liendres permanecen después del tratamiento apropiado, según lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría y los CDC. Se contactará a los padres y se les darán recomendaciones.

Por favor, vea el lado 2 en la parte posterior

6. IMPÉTIGO: El impétigo son llagas que se han infectado y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, incluida la cara. Las llagas pueden drenar el material infectado antes de volverse crujientes. Si las llagas no se han secado, deberán cubrirse mientras el niño está en la escuela. Su hijo puede regresar a la escuela una vez tratado por un médico durante al menos 24 horas. Al regresar a la escuela, el padre deberá proporcionar una declaración escrita del médico tratante.

7. TIÑA: La tiña es una infección fúngica de la piel, el cabello y las uñas. **Las tiñas deben cubrirse con un apósito limpio mientras el niño está en la escuela.** La tiña de la cabeza (cabello) deberá ser evaluada por un médico.

8. ERUPCIONES CUTÁNEAS: Cualquier niño que tenga una erupción no diagnosticada no puede venir a la escuela. Cuando el niño es enviado a casa desde la escuela con una erupción, se requiere una nota del médico para que el niño regrese a la escuela.

9. TOS/ESTORNUDOS/DRENAJE NASAL: Su hijo no debe venir a la escuela con tos excesiva, estornudos y drenaje nasal. Si el estudiante se ha mantenido despierto por la noche con estas interrupciones, permita que el niño se recupere en casa.

10. FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA: Si a su hijo se le diagnostica faringitis estreptocócica (**esto requiere una prueba especial por parte de un proveedor de atención médica**), su hijo debe quedarse en casa durante 48 horas después de que el médico haya comenzado la terapia con antibióticos.

Recuerde: El hecho de que un médico complete los formularios apropiados debe acompañar a cualquier medicamento que se administre durante el día escolar. (Consulte la política de medicamentos con respecto a la administración temporal de medicamentos).

Por favor, mantenga los números de teléfono de contacto de emergencia actualizados en la oficina de la escuela.