

YOUR CHILD SHOULD STAY HOME WHEN

Clatsop County Public Health Authority and Oregon Health Authority Communicable Disease Guidance for exclusion. This chart of concerns does not mention every possible complaint indicating exclusion and DOES NOT replace Medical Provider advice.

Symptom / Illness / Complaint:	School staff will:	Your child may return to school when:
Fever: ≥ 100°F	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to bring home as soon as possible.	24 hours with normal temperature and without fever-reducing medications,(Acetaminophen or Ibuprofen).
Cough: New, undiagnosed by MD.	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to bring home as soon as possible.	24 hours after the cough resolves If diagnosed pertussis (whooping cough): written clearance by LPHA OR Health Care Provider & 5 days of antibiotics.
Vomiting (at least one unexplained episode)	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to bring home as soon as possible.	at least 48 hours after last episode.
Diarrhea (unable to control bowel function, when previously could) OR (sudden onset of loose stools) OR <u>3 or more loose, watery stools in 24 hours.</u>	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to bring home as soon as possible.	at least 48 hours after last episode.
Concerning Eye Symptoms: colored discharge OR unexplained eye redness OR eye irritation, pain, swelling.	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to pick up & encourage an evaluation by a health care provider as soon as possible.	Eye drainage & redness has subsided OR Student has been examined and cleared by Medical Provider. OR student has been seen by Medical Provider and indicated therapy has started.
Suspected Strep Throat	Separate child from shared student space. Notify parent/guardian to pick up & encourage an evaluation by a health care provider as soon as possible.	Antibiotic therapy for at least 24 hours & no fever (refer to Fever criteria above). OR with Health Care Provider written permission.
Skin rash or open sore	If dispersed & suspicion of associated illness: Separate child from shared student space. Notify parent/guardian as soon as possible. Advise health care provider evaluation. If open sore, apply band aid & avoid touching.	No rash. Cleared by Medical Provider if associated illness exclusion criteria met. If fungal(ringworm) start treatment & exclude from contact sports/activities until resolved. Keep covered. If athlete's foot: start treatment & wear shower sandals, if using the locker room showers.
Headache with stiff neck and fever; OR with a recent head injury	Separate child from shared student space. If febrile. Provide rest. Observe. Notify parent/guardian to pick up & encourage an evaluation by a health care provider as soon as possible.	Fever & symptom-free for 24 Hours. Medical Provider note or Medical Provider release to return to activity following a head injury.
Acting different without reason: unusually sleepy or grumpy OR acting differently after a head injury	Notify parent/guardian to pick up & encourage an evaluation by a health care provider as soon as possible. Rest. Observe/monitor.	After return to normal behavior OR with Health Provider release and guidance.

A variety of other conditions may not be excludable; however personal physicians may restrict a student from returning to school for a specific duration. In this case, a provider's note is needed. **Questions/concerns-call Tobi Boyd, Seaside School district Nurse: (503)738-5586 or email: tboyd@seasidek12.org**

SU HIJO DEBE QUEDARSE EN CASA CUANDO

Autoridad de Salud Pública del Condado de Clatsop y Guía de Enfermedades Transmisibles de la Autoridad de Salud de Oregón para la exclusión. Este cuadro de inquietudes no menciona todas las quejas posibles que indican exclusión y **NO** reemplaza el consejo del proveedor médico.

Síntoma/enfermedad /queja:	El personal de la escuela:	Su hijo puede regresar a la escuela cuando:
Fiebre: ≥ 100 °F	Separe al niño del espacio compartido para estudiantes. Notifique a los padres / tutores para que lo traigan a casa lo antes posible.	24 horas con temperatura normal y sin bajar la fiebre medicamentos para(acetaminofén o ibuprofeno).
Tos: Nuevo, no diagnosticado por MD.	Separe al niño del compartido espacio con estudiantes . Notifique a los padres / tutores para que lo traigan a casa lo antes posible.	24 horas después de que se resuelve la tos. Si se diagnostica tos ferina: autorización por escrito de LPHA O del proveedor de atención médica y 5 días de antibióticos.
Vómitos (al menos un episodio inexplicable)	Separe al niño del estudiante del espacio compartido. Notifique a los padres / tutores para que lo traigan a casa lo antes posible.	Por lo menos 48 horas después del último episodio.
Diarrea (incapacidad para controlar la intestinal hacerlo función, cuando antes podía) O (aparición repentina de heces blandas) O 3 o más heces blandas y acuosas en 24 horas.	Separe al niño del compartido espacio de los estudiantes Notifique a los padres / tutores para que lo traigan a casa lo antes posible.	Por lo menos 48 horas después del último episodio.
Con respecto a los síntomas oculares: secreción coloreada Ocular inexplicable enrojecimiento irritación ocular, dolor, hinchazón.	Separe al niño del espacio compartido del estudiante. Notifique a los padres/tutores para que los recojan y anime una evaluación por parte de un proveedor de atención médica lo antes posible.	Drenaje de ojos y el enrojecimiento ha disminuido O el estudiante ha sido examinado y aprobado por un proveedor médico. O el estudiante ha sido atendido por un proveedor médico y ha comenzado la terapia indicada.
Sospecha de farinitis estreptocócica	Separe al niño del espacio compartido del estudiante. Notifique a los padres/tutores para que los recojan y anime una evaluación por parte de un proveedor de atención médica lo antes posible.	Terapia con antibióticos durante al menos 24 horas y sin fiebre (consulte los criterios de fiebre anteriores). O con el permiso por escrito del proveedor de atención médica.
La piel Erupciones o abierta herida	Si se dispersa y sospecha de una enfermedad asociada: separe al niño del espacio compartido para estudiantes. Notifique a los padres/tutores tan pronto como sea posible. Recomendar la evaluación del proveedor de atención médica. Si tiene una llaga abierta, aplique una tirita y evite tocarla.	Sin sarpullido. Aprobado por el proveedor médico si se cumplen los criterios de exclusión de enfermedades asociadas. Si se trata de hongos (tiña), inicie el tratamiento y excluya de los deportes / actividades de contacto hasta que se resuelva. Manténgase cubierto. Si tiene pie de atleta: comience el tratamiento y use sandalias para la ducha, si usa las del vestuario duchas.
Dolor de cabeza con rigidez en el cuello y fiebre; O con una lesión en la cabeza reciente	Separe al niño del espacio compartido del estudiante. Si es febril. Proporcionar descanso. Observar. Notificar a los padres/tutores para que recojan y alentar una evaluación por parte de un proveedor de atención médica lo antes posible.	Fiebre y sin síntomas durante 24 Horas. Nota del proveedor médico o Liberación del proveedor médico para volver a la actividad después de una lesión en la cabeza.
Actuar diferente sin razón: inusualmente somnoliento o de mal humor O actuar de manera diferente después de una lesión en la cabeza	Notifique a los padres/tutores para que recojan y fomente una evaluación por parte de un proveedor de atención médica lo antes posible. Descansar. Observar/supervisar.	Después de volver al comportamiento normal O con autorización y orientación del proveedor de salud.

Es posible que no se pueda excluir una variedad de otras condiciones; sin embargo, los médicos personales pueden restringir que un estudiante regrese a la escuela por un período específico. En este caso, se necesita una nota del proveedor. **Si tiene preguntas o inquietudes, llame a Tobi Boyd, enfermera del distrito escolar de Seaside: (503)738-5586 o envíe un correo electrónico a: tboyd@seasidek12.org**