

2024 - 2025 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Childcare and Pre-k Facilities

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements for childcare facilities by the Human Resources Code, Chapter 42.

A child shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a childcare facility in Texas.

Age at which child must have vaccines to be in compliance:	Minimum Number of Doses Required of Each Vaccine							
	Diphtheria / Tetanus / Pertussis (DTaP)	Polio	Hepatitis B (HepB) ¹	Haemophilus influenzae type b (Hib) ²	Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) ³	Measles, Mumps and Rubella (MMR) ^{1,4}	Varicella ^{1,4,5}	Hepatitis A (HepA) ^{1,4}
Zero through two months								
By three months	One dose	One dose	One dose	One dose	One dose			
By five months	Two doses	Two doses	Two doses	Two doses	Two doses			
By seven months	Three doses	Two doses	Two doses	Two doses	Three doses			
By 16 months	Three doses	Two doses	Two doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	
By 19 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	
By 25 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	One dose
By 43 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	Two doses

¹ Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

² A complete Hib series is two doses plus a booster dose on or after 12 months of age (three doses total). If a child receives the first dose of Hib vaccine at 12 - 14 months of age, only one additional dose is required (two doses total). Any child who has received a single dose of Hib vaccine on or after 15 - 59 months of age is in compliance with these specified vaccine requirements. Children 60 months of age and older are not required to receive Hib vaccine.

³ If the PCV series is started when a child is seven months of age or older or the child is delinquent in the series, then all four doses may not be required. Please reference the information below to assist with compliance:

- For children seven through 11 months of age, two doses are required.
- For children 12 - 23 months of age: if three doses have been received prior to 12 months of age, then an additional dose is required (total of four doses) on or after 12 months of age. If one or two doses were received prior to 12 months of age, then a total of three doses are required with at least one dose on or after 12 months of age. If zero doses have been received, then two doses are required with both doses on or after 12 months of age.
- Children 24 months through 59 months meet the requirement if they have at least three doses with one dose on or after 12 months of age, or two doses with both doses on or after 12 months of age, or one dose on or after 24 months of age. Otherwise, an additional dose is required. Children 60 months of age and older are not required to receive PCV vaccine.

⁴ For MMR, Varicella, and Hepatitis A vaccines, the first dose must be given on or after the first birthday. Vaccine doses administered within four days before the first birthday will satisfy this requirement.

⁵ Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of child) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." The written statement will be acceptable in place of any, and all varicella vaccine doses required.

Requisitos mínimos de vacunación en el estado de Texas de 2024 a 2025 para centros de cuidado infantil y de prekínder

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados en las secciones 97.61 a 97.72 del título 25 (Servicios de salud) del Código Administrativo de Texas (TAC). La gráfica no pretende sustituir la consulta del TAC, el cual contiene otras disposiciones y detalles. Según lo dispuesto en el capítulo 42 del Código de Recursos Humanos, se confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la facultad de establecer los requisitos en materia de inmunización para los centros de cuidado infantil.

Los niños deberán presentar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a un centro de cuidado infantil en Texas.

Edad a la que el niño debe recibir las vacunas para cumplir con los requisitos:	Número mínimo de dosis necesarias de cada vacuna							
	Difteria / tétanos / tos ferina (DTaP)	Polio	Hepatitis B (HePB) ¹	Haemophilus influenzae tipo b (Hib) ²	Vacuna anti-neumocócica conjugada (PCV) ³	Sarampión, paperas y rubéola(MMR) ^{1,4}	Varicella ^{1,4,5}	Hepatitis A (HePA) ^{1,4}
De zero a dos meses								
Antes de los tres meses	Una dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis			
Antes de los cinco meses	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis			
Antes de los siete meses	Tres dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Tres dosis			
Antes de los 16 meses	Tres dosis	Dos dosis	Dos dosis	Tres dosis	Quatro dosis	Una dosis	Una dosis	
Antes de los 19 meses	Quatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Quatro dosis	Una dosis	Una dosis	
Antes de los 25 meses	Quatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Quatro dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis
Antes de los 43 meses	Quatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Quatro dosis	Una dosis	Una dosis	Dos dosis

¹ Una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, paperas, rubéola, hepatitis B, hepatitis A o varicela se aceptarán en lugar de la vacuna.

² Una serie completa de la vacuna Hib consta de dos dosis más una dosis de refuerzo a los 12 meses de edad o después (tres dosis en total). Si un niño recibe la primera dosis de la vacuna Hib entre los 12 y los 14 meses de edad, solo será necesaria una dosis adicional (dos dosis en total). Si un niño ha recibido una sola dosis de la vacuna Hib en o después de los 15 a 59 meses de edad, cumple con los requisitos de esta vacuna específica. Los niños mayores de 60 meses de edad no necesitan recibir la vacuna Hib.

³ Si la serie de vacunas PCV se empieza a administrar cuando el niño es mayor de siete meses de edad, o si el niño se atrasó al recibir alguna dosis de la serie, entonces puede que no sean necesarias las cuatro dosis. Para ayudarse a cumplir con los requisitos, reférase a la información siguiente:

- Para los niños de siete a 11 meses de edad, se requieren dos dosis.
- Para los niños de 12 a 23 meses de edad: si han recibido tres dosis antes de los 12 meses de edad, entonces deberán recibir una dosis adicional (para un total de cuatro dosis) a los 12 meses de edad o después. Si han recibido una o dos dosis antes de los 12 meses de edad, entonces necesitan un total de tres dosis, una de las cuales al menos deben recibirla a los 12 meses de edad o después. Si no han recibido ninguna dosis, entonces necesitan recibir dos dosis y ambas deberán recibirlas a los 12 meses de edad o después.
- Los niños de 24 a 59 meses de edad cumplan con los requisitos si recibieron al menos tres dosis: una de las cuales la recibieron a los 12 meses de edad o después; o dos dosis, ambas recibidas a los 12 meses de edad o después; o una dosis recibida a los 24 meses de edad o después. De lo contrario, es necesaria una dosis adicional. Los niños mayores de 60 meses de edad no necesitan recibir la vacuna PCV.

2024 - 2025 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level												Notes		
	Grades K - sixth						Grade seventh	Grades eighth-12th							
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Diphtheria/Tetanus/ Pertussis(DTAP/DTP/DT/ Td/Tdap)								five doses or four doses	three dose primary series and one booster dose of Tdap / Td within the last five years					three dose primary series and one booster dose of Tdap / Td within the last 10 years	For K – sixth grade: five doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the fourth birthday. However, four doses meet the requirement if the fourth dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For students aged 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For seventh grade: one dose of Tdap is required if at least five years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.* For eighth – 12th grade: one dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. **Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.
Polio								four doses or three doses							For K – 12th grade: four doses of polio; one dose must be received on or after the fourth birthday. ¹ However, three doses meet the requirement if the third dose was received on or after the fourth birthday. ¹
Measles, Mumps, and Rubella ² (MMR)								two doses							For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹ Students vaccinated prior to 2009 with two doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement
Hepatitis B ²								three doses							For students aged 11 – 15 years, two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax®) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax®) must be clearly documented. If Recombivax® was not the vaccine received, a three dose series is required.
Varicella ^{2,3}								two doses							For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹
Meningococcal (MCV4)								one dose							For seventh – 12th grade, one dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11th birthday. NOTE: If a student received the vaccine at 10 years of age, this will satisfy the requirement.
Hepatitis A ²								two doses							For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective grade.

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

Requisitos mínimos de vacunas en Texas de 2024 - 2025 para estudiantes de kínder a 12.o grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Attention a notas y notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado						Notas
	Kindergarten	1o grado	2o grado	3o grado	4o grado	5o grado	
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)	cinco dosis o cuatro dosis	Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de la vacuna Tdap/ Td dentro de los últimos cinco años	Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de la vacuna Tdap / Td dentro de los últimos 10 años				Para los grados kínder a sexto: cinco dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe haberse recibido una dosis en o después del cuarto cumpleaños. Sin embargo, con cuatro dosis se cubre el requisito si la cuarta dosis se recibió en o después del cuarto cumpleaños. ¹ Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con tres dosis cumplen con el requisito si recibieron una de las dosis en o después del cuarto cumpleaños. ¹ Para el séptimo grado: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.* Para los grados octavo a 12.o: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.* *La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.
Polio		cuatro dosis o tres dosis					Para los grados kínder a 12.o: cuatro dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse una dosis en o después del cuarto cumpleaños. ¹ Con tres dosis se cumple con el requisito si la tercera dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños. ¹
Sarampión, paperas y rubeola ² (MMR)		dos dosis					Para los grados kínder a 12.o: Se requieren dos dosis de la vacuna, la primera de las cuales debe recibirse en o después del primer cumpleaños. ¹ Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con dos dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.
Hepatitis B ²		tres dosis					Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con dos dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg / 10 mL) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de tres.
Varicella ^{2,3}		dos dosis					Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis, de las cuales la 1.a dosis debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños. ¹
Vacuna antimeningocócica (MCV4)		una dosis					Para los grados 7.o a 12.o, se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.o cumpleaños del estudiante.
Hepatitis A ²		dos dosis					Para los grados kínder a 12.o: Son necesarias 2 dosis, la 1.a de las cuales debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños. ¹

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta. ↓